


PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE REACCIÓ AL·LÈRGICA

Nom i cognoms:

Edat: Curs:

Tutor/a:



Asma: Sí No

Al·lèrgies:

.....
.....
.....
.....
.....

Altres:

.....
.....

Instruccions addicionals:

.....
.....
.....
.....

Telèfons de contacte:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

REACCIÓ DE CARÀCTER LLEU O MODERAT

- Envermelliment, faves, picor
- Inflor de parpelles, boca, peus, mans,...
- Dolor abdominal, nàusees, vòmits, diarrea

COM ACTUAR

- No deixar l'infant sol
- Donar-li la medicació prescrita
- Localitzar l'autoinjector d'adrenalina
- Trucar als pares o tutors

Estar atent a símptomes d'anafilaxi

REACCIÓ DE CARÀCTER GREU



- Dificultat per respirar, tos, xiulets
- Picor o opressió al paladar i a la gola
- Dificultat per empassar, canvis de veu
- Defalliment, mareig
- Desmai, hipotensió, síncope

COM ACTUAR

- No deixar l'infant sol
- Administrar l'autoinjector d'adrenalina
- Trucar a l'ambulància
- Avisar a la família



En cas de dubte administrar sempre l'autoinjector



1. Subjectar fermament i retirar el tap de seguretat.



2. Col·locar l'extrem negre a la part externa de la cuixa.



3. Pressionar enèrgicament fins notar o escoltar el clic i mantenir 10 segons.



4. Retirar l'autoinjector i fer un petit massatge.

ALUMNE:

CURS:

POT MENJAR	NO POT MENJAR

OBSERVACIONS